

SUPER L-ETICINA

Antibiótico de amplio espectro, antiinflamatorio y antihistamínico

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-1069-096

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina clorhidrato.....	150 mg.
Dexametasona 21 Fosfato.....	0.5 mg.
Tripelenamina.....	10 mg.
Vehículo c.b.p.....	1.0 ml.

PRESENTACIÓN

Frascos con 20, 100 y 500 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

DOSIS

1 ml. por cada 10 kg de peso corporal.

ESPECIES

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

PROPIEDADES

- La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro que se absorbe por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular, donde los niveles terapéuticos se presentan de 15 a 30 minutos persistiendo por muchas horas.
 - SUPER L-ETICINA** se distribuye rápidamente en tejidos y líquidos corporales (con excepción del líquido cefalorraquídeo). Se elimina por la orina.
 - SUPER L-ETICINA** está indicada en el tratamiento de infecciones primarias y secundarias de bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.
 - SUPER L-ETICINA** es eficaz cuando se aplica en cerdos para el control de: pasteurelosis, erisipelosis, leptospirosis, metritis y mastitis.
 - En bovinos es eficaz para tratar anaplasmosis, neumonías por *Pasteurella*, neumonitis infecciosa, gábarro y actinomicosis. Cuando se aplica por vía intrauterina es útil en el tratamiento de metritis y piometra, también se usa para el tratamiento intramamario de la mastitis.
 - Es un antibiótico bacteriostático que ataca bacterias Gram positivas, Gram negativas, micoplasmas, ciertas rickettsias, protozoarios y gérmenes de la psitacosis (*Clamidia*), causante del linfogranuloma.
- SUPER L-ETICINA** actúa contra agentes tales como: *Haemophilus*, *Streptococcus*, *Bordetella*, *Salmonella*, *Shigella*, *E. coli*, *Vibrio*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Klebsiella*, *Neisseria*, *Leptospira*, *Pseudomonas*, *Brucella*, *Clostridium* y *Pasteurella*.



ADVERTENCIAS

No consumir la leche de animales tratados hasta 5 días después de su última aplicación. No consumir la carne de animales tratados hasta 30 días después del último tratamiento. No se administre en animales alérgicos. Para su aplicación utilice material estéril y nuevo.

RECOMENDACIONES

Consérvese en un lugar fresco y seco. No se exponga a la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.